

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRI

Keuhkopussin mesotelioma eli keuhkopussin syöpä

Keuhkopussin mesotelioma (keuhkopussin syöpä) on keuhkojen pintaa ja rintakehän sisäpintaa peittävän kalvon pahanlaatuinen, harvinainen syöpä. Tauti todetaan noin 70 - 90 henkilöllä Suomessa vuosittain. Työperäinen asbestialtistus on pääasiallinen keuhkopussin mesotelioman aiheuttaja, ja tupakointi lisää huomattavasti sairastumisriskiä. Alkuvaiheessa oireita ilmenee yleensä vähän ja sairaus havaitaan vasta sen aiheuttamien yleisoireiden perusteella. Taudinkuva on vaihteleva.

Keuhkopussin mesotelioman mahdollisia oireita ovat:

- yskä
- kipu
- laihtuminen
- keuhkopussin nesteily
- hengenahdistus

Em. oireiden selvittelyssä yleensä ensimmäinen tutkimus on keuhkojen röntgenkuvaus. Jatkotutkimuksena tehdään [tietokonekuvaus](#) kasvaimen tarkemman sijainnin ja levinneisyyden selvittämiseksi. Syöpäkasvaimen diagnoosi varmistetaan koepalalla, joka otetaan joko [neulanäytteenä](#) keuhkopussista paikallispuudutuksessa tai [keuhkopussin tähystyksen](#) yhteydessä.

Keuhkopussin syöpää hoidetaan solunsalpaajahoidolla. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Lisätietoa:

[Tyks /Keuhkosyöpä](#)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.