

Keuhkosityöpä

Keuhkosityöpä on keuhkoputken tai keuhkokudoksen solumuutoksesta alkunsa saava syöpä. Se on miehillä ja naisilla kolmanneksi yleisin syöpä Suomessa. Neljäsosa keuhkosityövistä todetaan sattumalta ilman edeltäviä oireita.

Tutkimukset aloitetaan, kun kuvauslöydösten tai oireiden perusteella on herännyt perusteltu epäily sairastumisesta.

Tavallisimpia keuhkosityövän oireita ovat:

- Hengenahdistus ja yskä
- Verta ysköksissä
- Kivut, esimerkiksi rintakehällä
- Laihtuminen, ruokahaluttomuus
- Heikkous, väsymys
- Kuumeilu
- Toistuva keuhkokuume
- Kaulan- ja/tai kasvojen turvotus

Lisätietoa:

[Keuhkosityöpä \(Terveyskirjasto\)](#)

[Keuhkosityöpä \(Terveyskylä\)](#)

[Keuhkosityöpä \(Syöpäjärjestöt\)](#)

Varsinais-Suomen hyvinvointialue • www.varha.fi

Satakunnan hyvinvointialue • www.satasote.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue • www.pohjanmaanhyvinvointi.fi