

## Keuhkosyövän leikkaushoito

Keuhkosyövät jaotellaan kahteen ryhmään: ei-pienisoluisiin keuhkosyöpiin ja pienisoluisiin keuhkosyöpiin. Ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitona on yleensä leikkaushoito, jos syöpä on todettu varhaisessa vaiheessa ja se kasvaa vain paikallisesti keuhkojen alueella. Leikkaushoito on mahdollinen noin 20 - 25% keuhkosyöpätapauksista.

Keuhkosyöpää sairastavan potilaan leikkauspäätökseen vaikuttavat kasvaimen mikroskooppinen tyyppi, levinneisyys ja potilaan yleiskunto, muut sairaudet ja keuhkojen toimintakyky. Moniammatillinen työryhmä laatii hoitosuunnitelman, mutta lopullinen leikkauspäätös tehdään yhdessä potilaan kanssa.

Keuhkosyöpäleikkauksen tarkoituksena on poistaa syöpäkasvain ja varmistaa diagnoosi.

Kirurgi kertoo potilaalle leikkauksen kulusta ja leikkaukseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä. Leikkaus on vaativa toimenpide, ja siitä toipuminen vie yleensä muutamia viikkoja tai kuukausia. Leikkaus voi heikentää keuhkojen toimintaa pysyvästikin.

Lisätietoa:

[Terveyskylä keuhkoleikkaus](#)  
[Keuhkoleikkauspotilaalle](#)

Varsinais-Suomen hyvinvointialue • [www.varha.fi](http://www.varha.fi)

Satakunnan hyvinvointialue • [www.satasote.fi](http://www.satasote.fi)

Pohjanmaan hyvinvointialue • [www.pohjanmaanhyvinvointi.fi](http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi)