

## Solunsalpaajahoidot jatkuvat

Remission jälkeen seuraavia solunsalpaajahoidoja kutsutaan konsolidaatiohoidoiksi, joita on annettava taudin uusiutumisen riskin pienentämiseksi. Konsolidaatiohoito kestää noin 5-7 päivää ja se annetaan osastolla. Heti kuurin jälkeen pääset kotiin ja käyt vain säännöllisin väliajoin, noin 2 kertaa viikossa, seurannassa osastolla. Seurantakäynnillä otetaan verinäytteitä, tarkkaillaan vointiasi ja annetaan tarvittaessa verituotteita tai lääkkeitä. Seurantakäyntiin kannattaa varata reilusti aikaa, sillä verikoetulosten valmistuminen ja lääkärin tapaaminen vievät aikaa.

Hoitojen välillä saatat tarvita kotonasi apua läheisiltä tai ulkopuolisilta auttajilta. Avun tarpeesta on hyvä keskustella osastolla hoitajaksolla ollessasi. Kotona ollessakin on tärkeää havainnoida omaa vointia ja olla yhteydessä hematologian osastoon, jos vointisi huononee kotona ollessa. Päivystykseen on hakeuduttava välittömästi kuumeen noustessa 38 asteeseen.

Solunsalpaajakuurien lukumäärä riippuu leukemiatyypistä, riskiluokasta ja siitä, onko hoitosuunnitelmassa kantasolusiirto. Yleensä hoitokuureja annetaan yhteensä 3-5. Yksi hoitokuuri voidaan antaa keskimäärin kerran kuukaudessa.