

Rintasyövän solunsalpaajahoito

Solunsalpaajia eli sytostaatteja käytetään syövän lääkehoitona ennen tai jälkeen leikkaushoidon. Solunsalpaajat vaikuttavat solujen kasvuun ja jakautumiseen.

Solunsalpaajien avulla syöpäsolujen jakautumisjärjestelmä vahingoittuu, jolloin ne eivät pysty lisääntymään vaan tuhoutuvat. Lääkeaineet kulkeutuvat verenkierron mukana kehon eri osiin saavuttaen näin myös sellaisia syöpäsoluja, jotka eivät näy röntgen- tai muilla tutkimuksilla.

Samalla kun solunsalpaajat tuhoavat syöpäsoluja, ne haittaavat myös vaihtelevasti terveiden kudosten solujen uusiutumista. Lähes kaikki solunsalpaajat aiheuttavat haittavaikutuksia. Niistä ja omista keinoistasi lievittää haittavaikutuksia saat tietoa hoidon suunnittelukäynnillä ja läpi hoitojen.

Solunsalpaajahoidon suunnittelu

Solunsalpaajahoidon suunnittelee syöpälääkäri ensimmäisellä käynnilläsi syöpätautien poliklinikalla. Ensimmäisellä vastaanottokerralla sinulle selvitetään hoidon tarkoitus, kesto ja haittavaikutukset. Lääkärin vastaanotolle tulet jatkossa sovitun ohjelman mukaisesti.

Missä solunsalpaajahoitoa annetaan?

Solunsalpaajahoito toteutetaan Turun yliopistollisen keskussairaalan [syöpäpoliklinikan](#) tiloissa.

Hoitokäynnit ovat polikliinisia. Lisäksi solunsalpaajahoitoa annetaan [Loimaan](#), [Salon](#) ja [VakkaSuomen](#) aluesairaaloiden lääkehoitopoliklinikoilla.

Lisätietoa:

[Yleisohje solunsalpaajahoitoa saavalle potilaalle](#)